

Ter Ameliyatında Başarı Oranları

Prof. Dr. Serdar HAN tarafından yazıldı.

Çarşamba, 19 Ocak 2011 07:36 - Son Güncelleme Cuma, 05 Ağustos 2011 13:04

Ter Ameliyatında Başarı Oranları

Prof.Dr.Serdar HAN

Videotorakoskopik klipsli ets ameliyatları sonrasında sempatektomiye bağlı olarak aşırı terlemelerde başarı oranları yüksektir. Aşırı el terlemelerindeki başarı oranı en yüksektir. Ulusal ve uluslararası yayınlarda da belirtildiği gibi aşırı el terlemelerinde başarı oranı % 100 e yakındır. Yüz terlemelerinde bu oran %90 nın üzerindedir. Koltukaltı terlemelerinde ise %70 civarındadır. Koltukaltı terlemelerinde sağ ve sol farklılığıda görülebilmektedir. Ameliyat sonrası sağ koltukaltı tamamen geçmesi solun ise terlemeye devam etmesi gibi. Ayak terlemelerinde videotorakoskopik sempatektomi sonrasında yanıt vermesi beklenmez. Ancak bu tip şikayetleri olan hastalarda ameliyat sonrasında yapılan sempatektomiye bağlı olarak hastaların %50 sinde etkilenme görülebilmektedir. Ayaktaki aşırı terleme etkisi tamamen geçmeden hafif etkilenmeye varan cevaplardır. Sempatektomi bu bölgelerin dışındaki genel vücut terlemesini etkilemez. Hatta bölgesel terlemelerin geçmesinden sonra ana gövdede ki terleme varsa artabilir, yoksa başlayabilir. Bu refleks terlemelerin çoğu yaklaşık %90 nı 3-4 ay içinde belli kabul edilebilir seviyeye ulaşmaktadır. Az bir kısım hastada ise aşırı olarak devam edebilmektedir.